

# Mémoire

n° 60.

Sur la Question proposée, par l'Académie  
de Chirurgie,  
Pour le prix de l'année  
1732.

## Question.

Pourquoy certaines Tumeurs doivent être extirpées, et d'autres simplement ouvertes; dans l'une et l'autre de ces opérations, — quels sont les cas où le Cauteris est préférable à l'Instrument tranchant, & les raisons de préférence.

Cette Question a certainement pour objet la matière de Chirurgie la plus étendue & la plus ordinaire dans la pratique. Elle est en même temps celle qui exige le plus de réflexion, de jugement, de conduite & d'habileté. Mais, quoiqu'il en soit du détail & du volume qu'elle demanderoit pour la traiter à fond, nous nous bornerons à ce que nous croirons de plus essentiel & de plus effectif.

La Question indique cinq sortes de Tumeurs, comprises sous le nom de Tumeurs humorales.

Objets de la  
Question.  
Cinq sortes de  
Tumeurs.

La première, de celles qu'il faut extirper

La seconde, de celles qu'il faut ouvrir

La troisième, de celles qu'on doit cauteriser

La quatrième de celles qu'on doit cauteriser & ouvrir

La cinquième de celles qu'il faut ouvrir & cauteriser.

La plus grande partie de ces Tumeurs, ont pour cause cause des Tumeurs.



générale l'Obstruction. Les autres, l'ouverture des vaisseaux sanguins.

Obstruction est l'embarras, l'engorgement d'un liquide dans quelque vaisseau.

Causes de l'Obstruction.

Les causes de l'Obstruction sont : la quantité surabondante du liquide, sa mauvaise qualité, ou des défauts dans les vaisseaux qui le contiennent, comme la perte de leur ressort ou l'augmentation de leur élasticité.

Raisons générales tirées de ces principes.

I. L'Obstruction précède toujours l'épanchement. L'épanchement naît, en conséquence, de l'Obstruction et de la fermentation.

II. L'épanchement ne détruit pas toujours toute l'Obstruction. Donc ces deux peuvent subsister ensemble.

Genres de tumeurs.

Deux genres de tumeurs ; Le premier de celles où les liqueurs sont contenus et embarrassés, dans leurs vaisseaux, ou dans des vaisseaux lymphatiques, par lesquels les sangs passent.

Le second genre est de celles dans lesquelles les liqueurs sont extravasés.

Tumeurs du 1<sup>er</sup> genre.  
Liqueurs contenus.

Deux sortes de tumeurs du premier genre.

La première de celles dans lesquelles les liqueurs embarrassés dans leurs vaisseaux ou dans des vaisseaux étrangers sont susceptibles d'une prompte fermentation : comme les sangs dans les différents degrés de l'Inflammation.

La seconde de celles dans lesquelles les liqueurs embarrassés ne fermentent point ou que longtemps après et par des circonstances étrangères au caractère de ces liqueurs : comme la lymphe dans l'Edème et dans les glandes engorgées.

Tumeurs du 2<sup>d</sup> genre.  
Liqueurs extravasés.

Deux sortes de tumeurs du second genre : L'une par épanchement, et l'autre par infiltration.

Nous entendons par épanchement un liquide déposé, à l'extérieur.

dans un même lieu et hors des lois ordinaires de la Circulation.  
Nous nommons Infiltration, l'insinuation d'un Liguide dans  
des Cellules qui se communiquent comme dans les Cellules, gene-  
ralement apelés, graisseuses.

De ces principes généraux naissent trois sortes de Tumeurs qui-  
sont l'objet de ce mémoire.

3. sortes de  
Tumeurs qui sont  
l'objet de ce mémoire.

I. Celles dans lesquelles les Liqueurs sont contenues dans leurs  
vaisseaux.

II. Celles dans lesquelles les Liqueurs sont épanchés.

III. Celles dans lesquelles les Liqueurs sont en partie contenues et  
en partie épanchés.

Si la matière est épaissie dans une ou plusieurs glandes; qu'elle  
soit visqueuse, compacte, parsemée, homogène; que les vaisseaux  
d'où elle est contenue soient privés de report; que la Tumeur  
soit dure, saillante, circonscrite, bien située, soupçonnée d'être  
viciée local, recouverte de tegumens que l'on s'efforce de conserver;  
dans tous ces cas (sans en exclure les Tumeurs avec lesquelles on  
emporte les tegumens) l'Extirpation est le seul remède.

Détails particuliers  
I. sortes de Liqueurs  
contenues.

doivent être extirpées

Nous comprenons sous ce genre de Tumeurs, les Glandes, les  
Loupes, les Arrièrillons, les Carcinomes, les Polyppes, les Elephantoses,  
les Cancers &c.

On extirpe ces Tumeurs pour trois raisons.

Pourquoy.

1.<sup>o</sup> à cause de l'Inutilité des caustiques. 2.<sup>o</sup> à cause de l'inconvé-  
nient qui résulteroit de l'usage de ces caustiques. 3.<sup>o</sup> pour ména-  
ger la peau dans certaines occasions.

I. Il est évident que si l'on tentoit la destruction d'une semblable  
Tumeur, par les caustiques, l'on en arriveroit jamais: ou du moins  
qu'après un tems considérable. ces remèdes s'aggravant que-  
l'entement et par des escarres momentanées; au lieu que l'instru-  
ment en lève tout, d'un coup de main, pour ainsi dire, ce que l'on  
cherche à consommer.

1.<sup>re</sup> raison



2<sup>de</sup> Raison.

II. Il est d'autant plus essentiel d'extirper que d'arracher les caustiques est sujet à de grande inconvénient; Leur action se faisant par l'intermission de parties pointues, tranchantes et brûlantes, ils attirent plus de sang et d'esprits sur les parties. Nouveaux ennemis qu'il faut craindre. De plus l'effort et l'action de ces parties brûlantes irritant et cauterisant les filets nerveux et membraneux répandus dans la tumeur, il faut qu'ils se racornissent; en durcissant qu'ils deviennent cailloux, renversés, chancreux. Ils ne le sont déjà, en fait tels qu'ils deviennent toujours lors que l'on emploie immédiatement les remèdes actifs.

L'expérience est certaine sur ce point de pratique. Les anciens ont quelquefois employé le caustère actuel, pour la cure de ces tumeurs principalement pour celle des Cancers. Il y en a eu qui se sont servi des caustiques comme de moyens moins cruels et plus propres à en réiterer l'application, persuadés que ces tumeurs étoient formées par un acide plus ou moins fixe et plus ou moins corrosif. Mais les modernes ont préféré de la chirurgie à tout l'autre. De ces remèdes, dans les cas dont nous parlons, comme sujets aux inconvénients que nous avons indiqués et inférieurs en tous points à l'extirpation; Convaincus que la plupart de ces tumeurs sont causées par le simple engorgement d'une ou de plusieurs glandes. Engorgement d'autant plus ordinaire, dans ces parties, que les glandes sont des vaisseaux entortillés et repliés les uns sur les autres.

3<sup>de</sup> Raison.

III. Nous disons que la nécessité de conserver le plus de tégumens que l'on peut fait rejeter les Caustères. Il n'est pas rare d'avoir tenté avec succès des réunions, même par la suture, après l'extirpation du corps glanduleux de certains tumeurs. On sent l'impossibilité de le faire en ouvrant la peau par des Caustiques.

Voilà pourquoi certains tumeurs doivent être extirpés.

• Nous observerons qu'il faut les extirper totalement afin d'éviter l'hémorragie qui n'en sauroit d'une extirpation imparfaite dans le corps de la Tumeur; ainsi que les hémorragies qui naissent d'un Placenta déchiré ou emporté en partie; ce qui n'arrive que parce que les vaisseaux sont variqueux, dilatés dans la Tumeur de même que dans le Placenta.

Si la Tumeur a une fluctuation sensible, que la matière 2.<sup>e</sup> sorte. Liquours épanchée soit aperçue par le toucher, qu'elle se présente bien, — épanchée.  
qu'elle soit superficielle, que les tegumens soient aminces et détrempés, I.<sup>re</sup> classe. Tumeurs qui  
que toute l'obstruction soit détruite par la fermentation et le panchement; l'ouverture par l'instrument tranchant est la plus sûre. Doivent être ouvertes avec l'instrument.  
l'opération qu'il faut préférer.

• Nous comprenons sous ce genre de Tumeurs: toutes sortes d'abcès, les anévrysmes vrais ou faux, les varices, les contusions où il y a du sang épanché, les dépôts dans la Poitrine; nous y comprenons encore la plupart des tumeurs à la tête à l'occasion d'un coup ou d'une chute quoique sans fluctuation sensible, lorsqu'elles sont suivies d'accidens qui font présumer quelque autre dérangement.

On ouvre les tumeurs en air car c'est le moyen le Pourquoy. plus sûr, le plus prompt, le plus méthodique enfin le seul indiqué au vrai chirurgien. On a bésoin, un dépôt, dans les environs de nous nous venons de parler, ne peut certainement exiger de cautérisation. Il faut évacuer la matière épanchée; c'est la première intention qui se présente; l'instrument tranchant s'offre pour ainsi dire de lui-même. On en verra faire voir son effet. Que serviroit le scalpel si qu'il ne faut qu'ouvrir le foyer? une foule de difficultés qui s'opposent à son usage se présentent, sans qu'on les cherche, bien mieux que je ne saurois les indiquer.

Voilà pourquoy certaines tumeurs doivent être simplement ouvertes. Observant de ne pas prendre icy le terme



Simplement pour signifier une simple ouverture. Il y a des occasions où il faut emporter les tégumens sans compter les autres parties pour mieux découvrir le sac et ne pas laisser de brides ni de retranchemens au pus.

Ce Supplément à l'ouverture est supposé par le Programme de l'Académie. Le mot de simplement y désigne les seuls instrumens, C'est à dire les instrumens sans cautère.

De plus l'on comprend icy les contre ouvertures, soit par la partie opposée comme aux extrémités; soit à la partie la plus déclive et la plus basse d'un abcès étendu, comme à l'aine dans les abcès entre les muscles du bas ventre et le Péritoine. D'autres aussi auxquels on fait plusieurs ouvertures, comme au voisinage du Perinée, dans le cas d'un dépôt occasionné par une maladie de Vésicule.

Enfin nous y comprenons les abcès que l'on ouvre avec le Troicart: méthode dont on se sert quelquefois pour mieux s'assurer de l'existence d'un pus épanché. C'est ainsi que de grands Chirurgiens ont percé des abcès au foie, au bas ventre, entre le Péritoine et l'Intestin, lorsque celui cy est adhérent ce qui peut lui arriver par une inflammation, le même qu'il arrive au Poulmon avec la Plevre.

Liquours épanchés.

2<sup>e</sup> Classe.

Tumeurs que quel-  
ques-uns cauteri-  
sent.

Si la Tumeur glanduleuse, dure, indolente, est soupçon-  
née de quelque vice particulier dans la masse du sang; —  
qu'elle soit à côté de quelques vaisseau dont on craigne  
l'hémorragie; que sa base soit large et profonde, —  
adhérente aux parties voisines; qu'elle aie des ouvertures  
par lesquelles transude une matière mal digérée, une  
serosité virulente; Que l'on craigne la régénération  
de quelques vices glanduleux que l'on n'auroit pu empor-  
ter; Enfin que l'on puisse la tarder, si je puis me servir  
du terme, par des trochisques plus ou moins corrosifs;

Le cautere est proposé par des praticiens de réputation.

Vous comprenons sous ce genre de tumeurs, une partie de celles que nous avons désigné pour l'extirpation, qui ont dégénéré par rapport à leur cause veroleuse, Séro-phuse, Scorbutique, connues sous les noms familiers de Parotides, de Bubons.

Cette pratique qui n'est que forcement de notre goût — comme nous le dirons plus bas est fondée sur trois raisons. Pourquoy.

1°. Parce qu'on ne peut pas extirper ces tumeurs.

3. Raisons.

2°. Parce qu'elles sont causées et entretenues par un vice partiel entier dans la masse du sang.

Enfin par la difficulté de les faire supurer dans les orges.

C'est des tumeurs qui paroissent inextirpables par leur situation. Première Raison.  
En voici un nombre propre à épouvanter les Chirurgiens timides ou qui ne sont pas assez anatomistes.

1°. Un Cancer qui paroît avoir des adhérences sous le grand — dentelle, sur les côtes des

2°. Des croûtes carcinomateuses aux glandes thyroïdes, qui semblent s'être coaptées avec la trachée artère ou situées profondément dans quelque autre partie du col; comme les glandes maxillaires inférieures, gorgées, dures, joignant par leur base la racine de la langue sous le muscle myloïdien.

3°. Les glandes amigdales affectées de même.

4°. Celles de dessous l'aisselle, qui se sont unies aux graisseuses profondes dans lesquelles elles sont ou dont elles sont — environnées.

5°. Dans le pli du coude sous le biceps, ou sous les jantes enfilant les interstices des tendons fléchisseurs de la jambe.

Enfin (pour ne pas entrer dans un trop grand détail) une tumeur chancreuse au dedans ou au dehors de la main dans laquelle les tendons paroissent confondus.



abus du feu & de la terre. Sur quoy nous demandons, supposant que ces Tumeurs dans ce premier cas sont guérissables, de quelle utilité seront les caustiques & en des semblables cas? Est-il d'instruments dans une main artiste, dirigée par une raison éclairée sur la véritable structure des parties, tâtonnant & séparant prudemment avec les doigts les parties qu'il faut détacher, nous demandons digne si cette dernière méthode n'est pas de préférence? Mais du moins celle de grand nombre d'illustres Chirurgiens dont l'usage téméraire nous a servi de règles. Instruits, de la situation & de la grosseur naturelle des vaisseaux & de la véritable attitude des parties, de leur liaison & de leur structure, que peut-on craindre? Nous au plus de ne pas extirper la Tumeur dans son entier. Cette difficulté s'en impose suffisamment par un véritable Chirurgien qui s'approchera de si près de l'extirpation totale qu'il évitera l'hémorragie dont nous avons parlé (pag. 5. lig. 1.) ou qu'il saura y remédier par la ligature, la compression ou le trépan.

Seconde Raison.

Celles qui sont causées & entretenues par un vice dans la masse du sang, exigent l'usage des Caustiques, dans une infinité d'occasions; parce qu'ils peuvent changer la disposition des liqueurs qui forment la Tumeur.

1°. Par les mouvements qu'elles acquièrent en se mêlant aux parties du caustique.

2°. Par leur abondance du sang & de esprits que leur irritation attire sur la partie.

3°. Par l'augmentation du repos des vaisseaux. D'ailleurs les caustiques, n'agissant que lentement comme nous l'avons insinué, ils donnent plus de temps à la nature & aux remèdes propres à la préparation des humeurs d'en corriger les défauts particuliers: soit par les anti-vénériens, soit

par les antiseptiques & la dernière circonstance qui certainement fait la partie la plus essentielle du mérite des Caustiques.

Nous pourrions faire voir que les Caustiques étant résolus abus du Cauterre, <sup>au 2<sup>e</sup> cas.</sup> tifs par accidens, leur usage sera pernicieux, dans plusieurs autres occasions, principalement dans les cas de vérole ou du moins aux Tumeurs qui la précèdent, à plus forte raison à celles qui en sont la suite.

La nécessité de faire supurer certaines Tumeurs d'une <sup>Troisième Raison</sup> les règles est selon quelques-uns la raison qui fait employer les caustiques: Comme aux Tumeurs érysipéleuses, ulcérées & sur lesquelles les émolliens mêlés avec les suppuratifs ou les pouripans font de mal effets.

Les Caustiques chauffent l'humour arrêté, ils excitent les fibres motrices des vaisseaux. Celle exerce ceux là (l'humour et les vaisseaux) aguerant plus de mouvement produisant souvent des fermentations heureuses, qui déterminent d'une part des supurations, tandis que de l'autre les parties les plus corrosives du Caustique caustifient successivement la Tumeur.

Mais pourquoi les glandes seront-elles exemptes d'extirpation? Qu'on elles de plus impotentes que les cancers ulcérés? <sup>au 3<sup>e</sup> cas.</sup>

Les uns et les autres ne sont ce pas des Tumeurs glanduleuses dures, circonscrites & souvent de même caractère par les changements qui arrivent aux premières. Si c'est la chose, je ne vois, en se servant alors des Caustiques, que de s'empêcher dans le Chirurgien ou son envie sordide de mériter plus de salaire en multipliant les pansements.

Poilâ pourquoi on caustifie certaines Tumeurs.



Mais nous ne craignons pas de dire que nous les  
exécutions. Les mauvais succès fréquens qui suivent l'autre  
pratique, le tems infini et les arrangemens qu'il faut  
prendre pour la faire réussir, ce qui arrive rarement -  
nous en a fait rejeter la méthode qui deshonore la  
Chirurgie et le Chirurgien actant fondée que sur une  
patience ignorante.

3<sup>e</sup> sorte de  
Tumeurs.  
Liquours contenues  
ou  
Liquours épanchés.

La troisième espèce de Tumeurs qui fait l'objet de ce  
Mémoire, est celle dans laquelle les liquours sont en  
partie contenus dans les vaisseaux et en partie épan-  
chés. Nous en compterons de deux sortes par rapport à  
la pratique.

2 espèces de  
ces Tumeurs.

La 1<sup>re</sup> celles dans lesquelles l'application du caustère  
précède l'ouverture que l'on fait sur l'écaille.

La 2<sup>de</sup> celles dans lesquelles l'ouverture précède les  
caustiques.

1<sup>re</sup> espèce.  
caustiquées par  
quelques uns.

C'est de faux abcès, si l'on peut ainsi parler, accompa-  
gnés de fluctuation et de dureté, où l'on sent du liquide  
épanché et d'autres contenus et encoir embarrassés dans les  
vaisseaux: tels que certains squirres, des bubons, des  
écrouelles et en general des Tumeurs lymphatiques  
qui prennent, quoique mal, la voie de suppuration; -  
mais dont la Tumeur n'est qu'en partie suppurée, tandis  
que l'autre partie conserve sa dureté. Quelque-  
fois on en pareils cas emploie une trainée de  
pierre à Caustère pour les raisons suivantes.

Pourquoy.

1<sup>o</sup> Parce que l'irritation que les parties de caustère  
font sur les filets nerveux, augmentant le mouvement  
et le ressort des vaisseaux comprimés et déterminent

l'humour contenue & arrêtée, à prendre un parti.

2°. Pour faire une perte de substance suffisante afin de découvrir plus de parties pour les faire sécher ensuite.

3°. Pour prévenir le ravage qui pourroit succéder à une fermentation déterminée par la nature, comme la très grande pourriture, les sinus &c.

Mais le caustique est-il bien indiqué dans ces occasions? Raisons contraires. Si l'augmentation des mouvements que les vaisseaux acquièrent par l'irritation font prendre un parti à l'humour arrêté, ce parti ne pourroit-il pas être celui des résolutions? Si cela est comme les partisans de ces remèdes Chimiques le pensent, ne doit-on pas en bannir l'usage au moins aux tumeurs vénériennes? D'ailleurs que gagne-t-on en brûlant beaucoup de peau. Ne faut-il pas toujours porter l'instrument dans le lieu où est l'épanchement, pour peu qu'il y en ait dut on percer le corps d'une glande gonflée? Car le caustique ne va certainement pas jusques là. Et puis qu'il faut ouvrir pourquoy ne le pas faire sans ce préparatif d'opérations? Si la perte de substance est nécessaire comme il n'est pas douteux, peut-on mieux travailler qu'avec un instrument tranchant, les tégumens sont-ils plus épais & la matière plus elle plus profonde?

Cependant voilà Pourquoi on se sert en général du caustique avant d'ouvrir une tumeur?

Mais cette méthode n'est pas la nôtre comme on vient de l'insinuer: nous allons passer à la dernière 2<sup>de</sup> espèce de tumeurs, on nous compte d'en montrer (aussin) 2<sup>de</sup> espèce doit être caustiquée.



que le pouvons permettre les bornes qu'on se doit pres-  
crire dans un mémoire) que cet, à l'exception d'un  
petit nombre de cas particuliers, le seul ou l'on doit  
employer les Caustiques.

Les Tumeurs que l'on ouvre et à l'ouverture desquels  
on fait succéder l'usage des caustiques sont principalement  
les Tumeurs enkistées renfermant un liquide épanché  
et dont on n'a pu enlever tout le kiste. Telles sont entre  
autres les Tumeurs que l'on reconnoît sous les noms  
d'atérôme, d'Ematôme, de Meliceris. Car comme les  
remèdes ordinaires que l'on emploie pour la supuration  
n'ont point assez d'activité on attendroit longtems que  
le reste de kiste supurât. Raisons pour laquelle on  
met en usage des scarotiques, des Trochisques mordans  
ou des corrosifs liquides, tels que les préparations  
arsenicales et autres, préconisées par Paracelse et  
Vanhelmon son disciple. Ces remèdes étant plus pénétrants  
plus divisans et caustiques ce qu'ils touchent consomment  
le reste du kiste, et expriment selon les occasions les chairs  
molles et baveuses, les excroissances fongueuses et mettent  
le reste en état d'être deséché et cicatrisé.

Voilà Bourguoy maitre du faulterre après l'ouverture  
d'un abcès. Non que nous fassions principalement usage  
sur l'entière extinction du kiste, nous ne pensons  
pas lui donner une pareille préférence; ce que nous  
avons eu des grands maitres et notre expérience nous  
ayant appris à enlever avec l'instrument tout ce qui peut  
être soumis à l'action des caustiques.

Pourquoy.

et nous convenons cependant qu'il est des cas où l'on ne  
sauroit s'empêcher de les employer. Tels sont les absus —  
qui succèdent à des Rhumatismes, à d'anciennes sciatig;  
à des dépôts goutteux dans les quels la matière est longtemps  
absorbée.

Sur quoy une réflexion importante:

Reflexion import-  
tante

Ces absus arrivent souvent sans changement à la peau  
et sans aucun signe de suppuration dans l'endroit où  
la douleur a été fixe: quoiqu'il puisse y avoir non  
seulement épanchement de pus, mais même altération  
et carie enlof comme sous les muscles pectoraux et  
autres à la partie supérieure de la Cuisse sous —  
l'épaisseur de robe la matière au toucher.

Il est assez ordinaire, lorsqu'on n'est pas assez hardi  
ou assez chirurgical pour ouvrir dans le lieu de la  
douleur, que la matière se fait sentir plus bas, lors-  
qu'ayant percé le kiste elle a été dans l'intervalle des  
muscles. Pour lors il faut non seulement ouvrir le lieu  
où se trouve la matière mais faire de petites perquisitions  
plus hautes où l'on trouvera, comme nous l'avons dit, alté-  
ration, carie, ou tout au moins un kiste qui ne pouvant  
être emporté totalement, à cause d'un débilement qu'il  
faudroit faire ou d'une hémorragie immodérée, exige —  
l'usage de sautoires, appropriés à la nature du dérangement.

On pourroit faire icy une longue énumération de  
cas où on les emploie avec succès mais, comme nous  
faisons moins un traité qu'une dissertation qui doit —  
être courte, nous croyons en avoir suffisamment dit



pour faire sentir notre façon de penser sur la partie  
de chirurgie qui fait le sujet de la Question qu'il  
s'agissoit de traiter dans ces Mémoires.



pour faire sentir notre façon de penser sur la partie  
de chirurgie qui fait le sujet de la Question qu'il  
s'agissoit de traiter sans Mémoire.

